

落葉果樹苗木生産販売專業



落葉果樹苗木

カタログ

令和8年秋▶令和10年春

長野県果樹苗木生産登録業者

お 有限 小町園
会社

〒399-3802 長野県上伊那郡中川村片桐 6626-2

TEL. (0265) 88-2628

FAX. (0265) 88-3728

<http://www.komachien.net/>



落葉果樹苗木カタログ

令和8年秋～令和10年春

目次

1～5頁	なし苗木
6～8頁	もも・ネクタリン苗木
9～13頁	りんご苗木
14頁	日本すもも苗木
15頁	プルーン苗木
16頁	証紙・公表事項・ 
17頁	ご注文についてのお願い

ごあいさつ

平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。弊社は創業以来「品種正確で優良な苗木」をテーマに社員一同自家生産に励んでまいりました。現在でも弊社の採種、台木から本苗までの一貫した生産体制は変わることはありません。

近年、種苗生産者の減少、毎年パターンの違う特殊な気象状況から全国的に苗木の供給が不足しているものと存じます。早期予約にて優良な苗木の確保をお勧め致します。今後とも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。

令和8年8月吉日


代表取締役社長

松澤正樹



有限会社小町園のマークについて


「品種正確な優良苗木」を自然の中で、職人の手仕事で育成するという企業姿勢を踏まえて、0（ゼロ）から1を作り出す苗木づくりを0（大地）と1（苗木）によって表現しました。



NASHI PEAR ROOTSTOCK

純系北支豆梨台木

小町園
KOMACHI
EN CO., LTD.



純系北支豆梨

北支豆梨について

北支豆梨は、中国東北部の原産で、果実は大豆位の大きさで非常に小さく、2心室で、果皮は灰褐色～暗褐色です。樹の強勢で、枝梢が分岐しやすく、新梢や葉が白いもうじに覆われる特徴があります。開花は日本梨より5～7日ほど遅く、黒星病には弱いですが。

当社においては、昭和35年頃導入、以後再導入、選抜、淘汰をおこなひ、採種母樹園を設置して、同一母本より毎年採種し、現在に至っています。国内にあって果実大きく、葉の緑濃く北支豆梨と称される梨は、そのほとんどが日本豆梨、日本梨または山梨などとの交雑種と思われる。

北支豆梨は台木に利用された場合、最もその能力を発揮し、乾燥や低温に強いことが知られています。当社の経験では過湿にも相当耐えることが判明しています。そのため、ユズ肌果・石梨果・縮果病の予防に用いられています。

北支豆梨の種子は非常に小さく、播種後1年では台木利用が難しいため、当社では2年間養成して使用しています。北支豆梨は深根性で細根に富みますが、当台木使用樹の伸長は、山梨台木樹と比べややわい性で8割程度になります。そのため節間がつまり、コンパクトな樹形で花芽がつき易くなり栽培しやすくなります。

※本カタログ中の「北豆台」とは北支豆梨台木の簡略記載です。

前年 採種母樹園にて



北支豆梨の細かい枝梢



北支豆梨花ざかり



採種作業中

1年目 播種1年目の北支豆梨



2年目 移植を終えた2年目の北支豆梨



3年目 3年目に接ぎ木へて本苗へ





NEW NASHI PEAR BY THE NAGANO NANSHIN AGRI.EXP.STN.

長野県南信農業試験場育成品種 北豆台



原木のサザンスイート

種苗法登録品種第 21631 号 (令和 7 年 3 月 10 日品種登録失効)

サザンスイート

長野県南信農業試験場において、平成 3 年八里に南水を交配、育成選抜され南農ナシ 4 号と命番、平成 24 年種苗法登録品種第 21631 号を獲得した。幸水より 1 週間程度早熟で極甘な早生の赤梨である。

果実は腰高な広楕円形で果重 300g 前後。果皮は緑～黄褐色。肉質はやや粗いが果汁多く、糖度 13.5～15%と早生としては非常に高く、酸味少なく食味優良。熟期は育成地で 8 月中旬、幸水より 1 週間早い。

樹勢中庸、短果枝の着生良好。開花は豊水と同時期。黒斑病に抵抗性、黒星病に耐病性を有する。



天空のしずく

種苗法登録品種第 31059 号

天空のしずく

長野県原種センターより許諾済

PVP

海外持出禁止
長野県内のみ栽培可

長野県南信農業試験場において育成された病害に強い中生品種。「南水」へ繋がる県オリジナル品種としてリレー販売が見込まれる。

収穫期は 9 月上～中旬で、「豊水」より 5 日程度遅く、「南水」より 11 日程度早い。果形は円形で、果実の大きさは約 400～500 g。果皮色は黄赤褐色。果肉は白色で適度な歯ごたえとシャリ感があり果汁が多い。糖度は 15%前後、酸度は pH4.5 程度で良食味。

病害に強く黒斑病に対して抵抗性を、黒星病に対して耐病性を有する。無袋栽培が可能。樹勢は中で、短果枝主体で栽培可能。



NASHI PEAR BY THE NATIONAL INSTITUTE OF FRUIT TREE SCIENCE

農研機構果樹茶業研究部門育成 梨品種 北豆台



種苗法登録品種第 9401 号 (2001 年 10 月 18 日登録)

あきづき

果種協より許諾済

PVP

海外持出禁止
公示 (農水省 HP) 参照

昭和 60 年新高×豊水に幸水を交配、平成 3 年選抜、平成 4 年より系統名筑波 47 号として系適供試、平成 10 年なし農林 19 号に登録、平成 13 年種苗法登録品種第 9401 号を獲得した。

果実は扁円形で果重 500g 前後の太果。果皮は黄赤褐色の赤梨で果面はきれいだ、有てい果の割合が高い。果肉は白色で軟らかく、糖度 12% 前後 (南信農試 14.9%) で酸味は少ない。香りは少ないが渋味なく食味優良である。熟期は育成地で 9 月下旬、豊水より 10 日遅く、新高より約 7 日早い。日持性は常温で 10 日から 2 週間位。

樹勢強く、枝梢は太い。短果枝の着生少なく、花芽の着生・維持に工夫が必要。開花期は豊水と同時期で、自家結実性は低い、結実性は良好で、早期落果・後期落果ともなく、収量性は高い。

種苗法登録品種第 11120 号 (2003 年 3 月 17 日登録)

あきあかり

果種協より許諾済

PVP

海外持出禁止
公示 (農水省 HP) 参照

昭和 59 年 162-29 (新高×豊水) に平塚 17 号 (雲井×幸水) を交配、平成 3 年選抜、平成 4 年より系統名筑波 45 号として系適供試、平成 12 年なし農林 20 号に登録、平成 15 年種苗法登録品種第 11120 号を獲得。

果実は円形で果梗は太く短い。果皮は黄赤褐色の赤梨で果点が多い。条溝が明瞭に現れ、有てい果の発生が多い。果重 400g 前後で玉揃い良好。果肉は白色で肉質は緻密で柔らかく果汁多い。糖度 12% 前後 (南信農試 15.2%) で酸味少なく食味良好。熟期は育成地で 8 月下旬、南信農試で 9 月上旬で、幸水と豊水の間となる。日持性は常温で 14 日程度と幸水より優れる。年により蜜症が僅かに発生する事がある。

樹勢は中で枝梢の発生はやや少ない。短果枝の着生は中で腋花芽はやや少ない。開花期は豊水とほぼ同時期で花粉量は豊富。黒斑病には抵抗性で、他の病虫害は通常防除で問題は認められていない。



あきづき



あきあかり



種苗法登録品種第 23913 号

甘太

果種協より許諾済

PVP

 海外持出禁止
 公示 (農水省 HP) 参照

平成 10 年王秋にあきづきを交配、翌年播種。育成選抜され平成 19 年筑波 58 号として系適供試、平成 27 年種苗法登録品種第 23913 号を獲得した新高とほぼ同時期に熟する高品質な晩生赤梨である。

果実は広楕円形で、果重 550g 程度、有てい果の発生が多い。果皮は黄褐色でさびの発生が多い。果肉は白く軟らかい。糖度は新高より高く、酸味は中程度で濃厚な食味で果汁は多い。成熟期は新高と同じかやや遅く、貯蔵性は新高よりやや劣る。

開花期は幸水とほぼ同時期で自家和合性はない。樹勢は強く立性。黒斑病抵抗性、黒星病はり病性だが慣行防除で対応可能。



農研機構 © 甘太

種苗法登録品種第 16480 号

なつしずく

果種協より許諾済

PVP

 海外持出禁止
 公示 (農水省 HP) 参照

平成 2 年平塚 25 号 (幸水×菊水) に筑水 (豊水×八幸) を交配、播種育成して系統名筑波 50 号として系適供試、平成 17 年なし農林 23 号に登録、平成 20 年種苗法登録品種第 16480 号を獲得した早生青梨である。

果実は扁円形で果重 330g 前後。果皮は無袋栽培でもサビが少なく、外観良好。糖度は 11.8% 前後、酸味少なく果肉軟らかく果汁多く食味は幸水並に優れる。熟期は育成地で 8 月中旬、幸水より 1 週間程早い。蜜症の発生は少ないが、収穫前落果はわずかに見られる。

樹勢はやや強く、枝の発生密度はやや少ない。短果枝の着生は中、腋花芽の着生はやや少であり、花芽の確保・維持に工夫が必要。

黒斑病に抵抗性、黒星病は通常防除で問題ない。



なつしずく

種苗法登録品種第 11119 号 (2003 年 3 月 17 日登録)

秋麗

果種協より許諾済

PVP

 海外持出禁止
 公示 (農水省 HP) 参照

昭和 57 年幸水に筑水を交配、平成 3 年選抜、平成 4 年より系統名筑波 46 号として系適供試、平成 12 年なし農林 21 号に登録、平成 15 年種苗法登録品種第 11119 号を獲得した、秀玉と同時期の高品質青梨である。

果実は扁円形で果重 430g 前後と大きい。果皮は黄緑色の青梨で無袋では中程度のサビが果面全体に発生する。果肉は白色で軟らかく肉質緻密で風味を有する。糖度 13% 前後 (南信農試 14.6%) で酸味少なく渋味なく果汁多く食味優良である。熟期は育成地で 9 月上旬で秀玉とほぼ同時期。日持性は常温で 10 日位と平均的。果皮が傷つき易いので収穫果の取扱いには注意を要する。落果性は認められていない。

樹勢は中で枝梢の長さ、太さともに中。短果枝、腋花芽の着生は多い。開花期は幸水と同時期と遅く、花粉量は豊富、筑水とは不和合。黒斑病には抵抗性で、他の病害虫は通常防除で問題ない。



秋麗

種苗法登録品種第 11118 号 (2003 年 3 月 17 日登録)

王秋

果種協より許諾済

PVP

 海外持出禁止
 公示 (農水省 HP) 参照

昭和 58 年 C 2 (慈梨×二十世紀) に新雪を交配、平成 3 年選抜、平成 4 年より系統名筑波 48 号として系適供試、平成 12 年なし農林 22 号に登録、平成 15 年種苗法登録品種第 11118 号を獲得した大果晩生赤梨。

果実は円楕円形ながら倒三角形の果実も多数混在する。果重 700g 前後と大きい。果皮は黄褐色の赤梨で果面は滑らか。果肉は雪白色で緻密で柔らかい。糖度 11 ~ 12% で新高と同程度。酸味はやや強い方ながら、渋味なく果汁多く食味良好。熟期は新高と晩三吉の間で、育成地で 10 月下旬から収穫可能、南信農試では完熟しない。後期落果が発生し易く、芯腐れ、蜜症の発生もみられる。日持性良好で、28 日以上。

樹勢強く枝梢は太くて長い。短果枝の着生、維持は容易。開花期は豊水と幸水の間で花粉量は豊富、幸水とは不和合である。黒斑病には抵抗性で、他の病害虫は通常防除で問題は認められていない。



王秋



NASHI PEAR NOW

につぽんなし 有望品種

小町園
KOMACHI
EN CO., LTD.



甘ひびき

種苗法登録品種第 19290 号

甘ひびき

育成者より許諾済

愛知県安城市の猪飼孝志氏が愛甘水の自然交雑実生より育成選抜した品種で、平成 22 年種苗法登録品種第 19290 号を獲得した早生の赤梨である。

果実は扁円形で果重 600g と大きい。果皮は黄赤褐色、果肉は黄白色で硬さは中、粗密も中、果汁は多い。糖度 13 ~ 14%、酸は極少。裂果は無い。熟期は育成地で 7 月下旬 ~ 8 月上旬。

樹姿立性、枝の長さ・太さは中、短果枝は少。開花期は晩。

PVP

海外持出禁止



愛甘水

種苗法登録（平成 14 年 8 月 6 日失効）

愛甘水

愛知県安城市の猪飼孝志氏が、昭和 54 年長寿に多摩を交配、選抜育成して、平成 2 年種苗法登録品種第 2352 号を獲得したが失効した。

幸水より約 10 日位早い赤梨で、育成地において 7 月下旬 ~ 8 月上旬に収穫出来る。果実は扁円形で、350g ~ 400g になり、早生種としては大果となる。果面は光沢がありきれい。果肉は黄白色でやや固い。糖度は 13 ~ 14% と高く食味良好である。日持性は早生種としては普通。

樹勢やや弱く、樹姿は中間、短果枝の着生はやや多い。開花期は長寿とほぼ同じで、受粉親和性は豊水・新興・二十世紀・松島・ヤーリーは有り、幸水はない。黒星病・黒斑病に強く栽培し易い。

種苗法登録（平成 21 年 12 月 17 日失効）

ゴールド二十世紀

農研機構農業生物資源研究所放射線育種場において、昭和 37 年二十世紀にガンマー線を照射して突然変異を誘発、56 年選抜、平成 2 年なし農林 15 号に登録、平成 3 年種苗法登録品種第 2932 号を獲得した、黒斑病抵抗性二十世紀である。

黒斑病に耐病性ではあるが周辺キメラと推測され、先祖戻りを生じる可能性もある。発病が著しい枝は切除する。熟期は 3 日程度遅い。その他の特性は二十世紀とほぼ同じである。



原木の南水

種苗法登録（平成 20 年 6 月 14 日失効）

南水

昭和 48 年越後に新水を交配、播種育苗して 58 年選抜、南農なし 1 号と命番、平成 2 年種苗法登録品種第 2293 号を獲得した。

果実は扁円形で果重 360g 平均、玉揃い良好。果皮は黄赤褐色の赤梨で、果肉は白色で軟らかく、肉質中位。糖度 15% 前後と甘味多く、果汁多く酸味少なく、食味非常に優良である。成熟期は育成地で 9 月下旬 ~ 10 月上旬で、豊水の 10 日位後。貯蔵性に優れ、普通貯蔵で約 2 週間、冷蔵で 2 カ月以上と長い。

樹勢中庸、樹姿は新水に似る。短果枝の着生多く花芽の維持は容易。開花期は二十世紀とほぼ同じ。黒斑病は罹病性で徹底防除が望まれる。

幸水

昭和 16 年菊水に早生幸蔵を交配育成した赤梨で、昭和 34 年命名公表された。現在の赤梨を代表する経済品種である。

果実は扁円形、果重 300g 位で果形・玉揃い良い。果肉は白色、肉質ち密で軟らかく多汁で、糖度 13% 位と高く、酸味少なく品質極めて優良である。熟期は長野県で 8 月下旬 ~ 9 月上旬。日持は短く約 1 週間。

樹勢やや強く開張性。短果枝の着生少なく花芽の維持は難しい。開花期は長十郎とほぼ同時期で、二十世紀・豊水より 4 ~ 5 日遅い。新水とは交配不親和。黒斑病には抵抗性、黒星病・胴枯病に弱い。

豊水

昭和 29 年幸水にイー 33 を交配育成した赤梨で、昭和 47 年命名公表された。幸水と並び赤梨を代表する経済品種である。

果実は円～短楕円形で、果重 350g 位。果肉白色、肉質やや粗なるも軟らかく多汁で、糖度 13% 位と高く、酸味もあり食味優良。熟期は長野県で 9 月中～下旬。日持は長十郎よりやや劣る。

樹勢中位で、枝梢の発生多く伸長も旺盛なるも新梢先端は湾曲する。短果枝の着生、維持は比較的容易で豊産。開花期は二十世紀とほぼ同じで、黒斑病には抵抗性、黒星病にもやや強い。二十世紀と共に幸水の授粉には利用できる。

苗木養成品種（品種解説省略）

豊華 新高 松島 長十郎

ヤーリー オーロラ

ラ・フランス ルレクチェ



PEACH ROOT STOCK

「おはつもも」・「赤葉台木」について



「おはつもも」とは

おはつももとは、長野県下伊那郡大鹿村に在来する極小粒の桃で、昭和25年頃から、長野県南信農業試験場及び農研機構果樹研究所により調査・研究されておはつもも（E系統＝下伊那野生桃No.5＝大鹿No.10）は、“サツマイモネコブセンチュウ免疫性で、最も小粒で離核であり（台木用種子は小粒で離核の方が取り扱いやすい）、種子生産力、発芽率とも良好で、実生は細根の発生多く、根全体の生育も良好で、また、苗木の生育も均一で管理が容易である。”と発表された。

弊社にては、昭和50年以降複生採種母樹により種子増産に努めてまいりました。近年要望の強い台木の販売を致します。
《種苗法登録品種の接立は違法行為無き様充分配慮致します。》

桃台木筑波系統のご紹介

今迄の桃台木品種及び台木生産の現状を憂えた農研機構果樹研究所では、育種第三研究室を中心に、昭和42年以来台木用桃品種の育種がなされ、昭和57年桃台木筑波1～10号が一次選抜、命番された。この内7～10号は緑葉系統で、おはつもも及び下伊那野生桃No.4（大鹿No.7）の自然交雑実生である。

1～6号は赤葉系統で、1号は暖地向、2・3号はレッドドワーフ、4～6号は普通台木として優良で、その一代雑種迄はサツマイモ・ジャワ・リンゴネコブセンチュウ免疫性である。5号は生育の揃い良く、穂品種の生育抑制傾向が認められ、若木時から花芽の着生良く、品質の良い大きな果実となり、収量性も確保できる果実生産性の高い台木であるとの結果が得られた。

近年温暖化による凍害が各地で目立つ様になり、おはつもも台でより多く、凍害発生のより少ない筑波5号実生台へ桃苗木生産の主力を移行しましたのでご了承願います。



おはつももの果実



桃台木筑波5号の果実



PEACH NOW

もも有望品種



赤宝

赤宝®

(有)小町園商標登録商品

☐おはつもも台 ☐筑波5号実生台 ☐払子実生台

JA塩尻市管内において、平成10年弊社納入大玉あかつきより早生系一樹変異を発見。着色・品質・日持性に優れた早生あかつき。

果実は扁円形、果重280g平均で玉揃良好。果皮の着色下枝迄も容易で鮮赤色に着色して美麗。果肉は白色で着色が進むと紅色素が入る。肉質ち密でややゴム質、日持性良い。糖度平均13%と高く、果汁多く食味優良である。核は半粘核で核割れは若干発生する。熟期は育成地で7月下旬、なつきとほぼ同時期。縦長果より丸味を帯び豊富な果実となった時が適熟。

樹勢強く花粉があり豊産。小玉果が生理落下しにくいので、必ず仕上摘果の励行を願いたい。樹齢が進み樹勢が安定すると、より玉伸する様になる。

種苗法登録（平成24年8月21日失効）

払子

長野県佐久市の故小平忠雄氏が、昭和35年白花の野生桃を発見。以後選抜育成して、平成15年種苗法登録品種第11374号を獲得した。小平種苗農園の発表によると、毛細根に富み、セン虫害、根頭ガン種病がほとんどなく、乾湿害に強く、寒害にも強い。また改植障害が少なく生育良好である。



もも苗木のトンネル



PEACH AND NECTARIN BY THE NAGANO FRUIT TREE E.S.

長野県果樹試験場育成品種



種苗法登録品種第 8565 号 (令和 7 年 12 月 23 日失効)

なつっこ

☐ おはつも台 ☐ 筑波 5 号実生台 ☐ 弘子実生台

果実は扁平形、果重は原木で 300g 前後と大きい。果皮の着色は容易で裂果の発生はないが、果点が荒れ易い為有袋栽培が基本となる。果肉は乳白色で果肉内着色はあるが少ない。肉質は密で溶質の硬。糖度 14 ~ 17% と高く、酸度は pH5.0 前後で主要品種に比べやや少ない。核は粘核で核割れの発生はほとんどない。収穫期は育成地で 8 月中～下旬、山根白桃とほぼ同時期で、川中島白桃の前となる。日持性は川中島白桃並で優れる。

樹勢やや強く、樹姿やや開張性。開花期は主要品種とほぼ同時期で複芽で花芽多く、花粉を有し結実良好な為摘雪を要す。病害虫は通常防除で問題なく、せん孔細菌病にはやや強いと思われる。



種苗法登録品種第 28952 号

スイートクリスタル

長野県原種センターより許諾済

☐ 筑波 5 号実生台

樹姿は直立と開帳の中間を示し、樹勢はやや強く、花粉を有する。また、花芽の数が多いため、結実は良好。果樹試験場 (須坂市) において、発芽期は 3 月下旬、開花期は 4 月中下旬、収穫期は 7 月下旬である。

果形は筑波 4 号台木では円形、原木では扁平形であった。果皮の着色は多く、果実全面が赤色に着色する。着色が良好であるため、無袋栽培が可能である。収穫前の天候により果点荒れがやや見られ、裂果する場合がある。果肉の色は白色で肉質は溶質、果汁は中である。果実重は筑波 4 号台木樹で 150 ~ 160g、原木で 160 ~ 190g。糖度は 14 ~ 16% であり、酸度は pH4.4 程度と酸味少なく、食味良好である。核の粘離は粘核である。



海外持出禁止
長野県内のみ栽培可



PEACH BY THE NATIONAL INSTITUTE OF FRUIT TREE SCIENCE

農研機構果樹茶業研究部門育成 桃品種



種苗法登録品種第 26635 号

さくひめ

果種協より許諾済

☐ 筑波 5 号実生台

平成 15 年に農研機構において、ブラジルから導入した低温要求時間の短い品種「Cora」の後代実生である 296-16 と 332-16 を交雑し選抜され、平成 30 年に種苗法登録品種第 26635 号を獲得した果実品質がよく主要品種よりも必要低温要求性の低い早生桃である。

温暖化により冬の気温が高くて、安定した開花と結実が見込めることに加え、果実の大きさや糖度は日川白鳳と同等で、日川白鳳よりも 5 日ほど早く成熟する。

果形は扁平から円形で、果実重は 253 g 程度と早生品種としては大きい。果皮の地色に緑色が残ることがある。着色は中からやや多い程度である。年により果皮の荒れや裂果が微から少程度発生することがあるため、有袋栽培が望ましい。果肉は白色で溶質、果汁は多い。核は粘核、糖度は 12 ~ 13% 程度、酸度は pH で 4.6 前後と少なく、食味良好である。



種苗法登録品種第 10382 号 (2002 年 7 月 10 日登録)

なつおとめ

果種協より許諾済

☐ 筑波 5 号実生台

昭和 59 年あかつきによしひめを交配、選抜育成され系統名筑波 111 号として系適供試、平成 10 年にも農林 23 号に登録、平成 14 年種苗法登録品種第 10382 号を獲得した、あかつきの後に収穫できる中生白肉桃である。

果実は扁平形で果重 230 ~ 300g。果面は条状に着色し、裂果・肌荒れはなく無袋栽培可能。果肉は白色、溶質でしまり、肉質は密で繊維はやや多い。糖度 13 ~ 14% と高く、酸味少なく食味優良。核は粘核。熟期は育成地で 8 月上旬、あかつきの 10 日程後、よしひめの 5 日程前。

樹勢中、樹姿やや直立。花粉を有し自家結実性で豊産性。



海外持出禁止
公示 (農水省 HP) 参照



PEACH

桃有望品種


 小町園
KOMACHI
EN CO., LTD.


大玉あかつき

本種発売元祖

大玉あかつき

昭和 59 年より一貫同一系統

☐ おはつもも台
 ☐ 筑波 5 号実生台
 ☐ 弘子実生台

山梨県笛吹市一宮町で栽培されているあかつきの大玉系枝変わりで、大玉で栽培容易な日持性に優れる中生の最優良経済品種である。

果実は扁円形、果重 270 ～ 300g 位で玉揃い良く、果皮の着色容易。果肉は白色でち密、ややゴム質で優良。果汁多く、糖度 13 ～ 16% と高く、酸味少なく品質優良。粘核で、核周囲の着色は熟度が進むと少しある。核割れは少しあり、摘蕾を多くすると増える。熟期は長野県で 8 月上旬。上下枝の品質差少なく、日持性特に良い。

樹勢強く、若木の間は立ち易いが、落ち着くと開張性となる。開花期は白鳳より早く、花粉多く自家授精率は高い。葉は広く、白鳳より緑濃い。耐病性強く、特に弱い病害虫は見当たらない。



おどろき

種苗法登録（平成 17 年 12 月 17 日失効）

おどろき

☐ 筑波 5 号実生台

長野県佐久市の大井守人氏が、昭和 48 年白鳳の枝変わりを発見、平成 3 年種苗法登録品種第 2931 号を獲得したが平成 17 年失効。

果実は扁円形、果重 300 ～ 350g と大きく、着色容易。果肉は乳白色で果肉内着色は少ない。肉質やや密で不溶質、繊維は少ない。糖度 14% 位と高く酸味は少ない。果汁は中位。半粘核で核割れ少。熟期は育成地（標高 690m）で 8 月下旬から。山根白桃とほぼ同時期からで収穫期間は長い。日持性特に優れ、上下枝の味の差少ない。裂果なく無袋栽培可能。生理落果・収穫前落果少なく、栽培容易である。

樹姿開張性、樹勢・枝梢の太さ・節間長は共に中。花粉が無いので授粉樹を要す。——早採りは厳に慎みたい——



川中島白桃

川中島白桃

☐ おはつもも台
 ☐ 筑波 5 号実生台
 ☐ 弘子実生台

長野市川中島町の池田正元氏が、偶発実生より育成した 8 月下旬に熟する、大玉で玉揃い・外観・食味・日持性共に良い優良経済品種。果実は腰高の整った円形で果重 300g 位。果皮は全面紅色に容易に着色する。果肉は白色で果肉内着色は僅かにある。肉質やや粗でしめる。甘味多く酸少なく多汁で食味良好。核は粘核で核割れは少ない。樹勢やや強く樹姿開張性。花粉無く授粉樹を要す。

苗木養成品種（品種解説省略）

千曲 黄金桃 浅間白桃
サマークリスタル



幸茜

種苗法登録（平成 29 年 12 月 19 日失効）

幸 茜

☐ おはつもも台

山梨県笛吹市一宮町の飯島典雄氏が、昭和 52 年山一白桃の枝変りを見。平成 14 年種苗法登録品種第 10886 号を獲得した、着色容易で食味優良な日持性のある大果晩生品種である。

果実は円形、果重 400g 前後の大果。果皮は乳白の地色に真赤に着色する。果肉は白色で切った後の変色が遅い。肉質良く糖度 15% 前後と高く果汁多く食味優良。香気は中。核周囲の着色は多く、粘核。熟期は育成地で 8 月下旬～9 月上旬、あきぞらの直後、山一白桃の前となり、日持性がある。

樹姿開張、樹勢中庸。葉は大きく、よじれる特性を持つ。開花期は中、花粉が有り豊産。通常防除で特に弱い病害虫は見当たらない。



SWEET APPLE

りんご有望品種


 小町園
KOMACHI
EN CO., LTD.


甘い夢

種苗法登録品種第 26019 号

甘い夢

育成者より許諾済《本種は自家増殖を認めません》

□ 丸葉台 □ M9 ナガノ台丸葉付

長野県松川町（株）なかひら農場の中平義則氏がなっぶる他の自然交雑実生より育成選抜した品種で、平成 29 年に種苗法登録品種第 26019 号を獲得した極甘品種である。

果実は扁円形、果重 300g 位、果皮は黄白地に赤、縞は不明瞭。果肉は黄白、肉質良く果汁多く、香りもある。適熟期の糖度は 18% 前後と極めて高く酸味は感じない。熟期は 8 月下旬で、日持性は常温で約 2 週間。

耐病性強く、収穫前落果無く、つる割や日焼けも無く、豊産性で良品率が高い。

PVP



なっぶる

種苗法登録品種第 24967 号

なっぶる

育成者より許諾済《本種は自家増殖を認めません》

□ 丸葉台 □ M9 ナガノ台丸葉付

長野県松川町（株）なかひら農場の中平義則氏がゴールデンの自然交雑実生より育成選抜した黄色種で、平成 28 年種苗法登録品種第 24967 号を獲得。出願迄に 14 年を要した。蜜入極多の注目品種である。

果実は扁円錐形で果重 320g 前後。果皮は黄色でさびはがくあに中位。果肉は黄白で蜜入極多。糖度 15% 前後、酸味は少なく風味があり、食味はふじに似る。収穫期は 10 月 10 日前後、日持性は短い。

樹勢強く開帳性で花芽の着生良好。収穫前落果は少しある。

PVP



奥州ロマン

種苗法登録品種第 25260 号

奥州ロマン®

商標登録品種、育成者より許諾済

□ 丸葉台 □ M9 ナガノ台丸葉付

岩手県奥州市、紅果園の高野卓郎氏が育成した鮮やかな紅色が美しい、育成地で 10 月中下旬に収穫できる期待の品種である。

平成 13 年、シナノゴールドにつがるを交配。育成選抜を経て平成 28 年種苗法登録品種第 25260 号を獲得。品種名は「高野 5 号」。商品名は奥州市を代表するりんご品種として育てたいの思いから商標登録を獲得した「奥州ロマン」として販売する。

育成者談として糖度 16% 前後で酸味が少なく、シャキシャキした今迄のりんご品種にない独特の歯触り。高温でも着色良好。芯カビ等の発生は無く、中生品種とすれば貯蔵力は抜群である。

岩手県で行われた複数の果樹品種検討会の試食アンケートから「ふじ」に比べ甘く、硬さを保っており、果汁も多いという回答が多かった。

- ・本品種は会員制とし、ご購入者の情報を収集します。
- ・会員資格を取得された方には 20 本からの販売としますが、自家増殖については制限を設けません。

PVP

海外持出禁止



はるか(有袋)

種苗法登録品種第 9930 号（2002 年 3 月 15 日登録）

はるか

登録者より許諾済

□ JM 7 台

前岩手大学農学部教授、横田清氏が育成した甘系黄色晩生種で、ふじと同時期に熟し、ふじとの 2 色贈答用に評価急上昇中である。

昭和 52 年ゴールデンデリシャスの自然交雑種子を播種、育成選抜されて平成 14 年種苗法登録品種第 9930 号を獲得した品種である。

果形長円錐形、果重平均 260g で大きいものは 300g を超える。果皮は黄色で陽光面薄赤に着色する。サビは少ない。果肉は黄色で極めて硬くしまり、肉質良く果汁に富む。糖度 15 ~ 17% と高く、酸 0.3% と少なく、蜜が入り甘味を強く感じる。熟期は育成地で 11 月中旬でふじとほぼ同時期。貯蔵性高く冷蔵で翌年 4 月迄可能。

樹勢中庸、やや開張性で短果枝の着生多い。開花期は王林より 2 日遅く、ふじより 2 日程早い。花粉量多いが自家授精は少ない。収穫前落果は極めて少ない。斑点落葉病には強く、芯カビ・ウドンコ病は現在迄認められていない。他の病害虫は通常防除で現在迄問題ない。

PVP

海外持出禁止



NEW APPLE BY THE NAGANO FRUIT TREE EXPERIMENT STATION

長野県果樹試験場育成品種

小町園
KOMACHI
EN CO., LTD.



シナノリップ

種苗法登録品種第 26584 号

シナノリップ

長野県原種センターより許諾済

☐ 丸葉台 ☐ M9 ナガノ台丸葉付 ☐ JM 7 台

長野県果樹試験場において、平成 12 年千秋にシナノレッドを交配、翌年播種。育成選抜されてリンゴ長果 25 と命番、平成 30 年種苗法登録品種第 26584 号を獲得したつがるの前に熟する早生種である。

果形良く、果重 300g 前後。果皮紫紅色で縞状に着色、白色ブルームがのる。糖度 14%、酸 0.4% と少ない。熟期は 8 月中下旬で、つがるの前。日持性は常温で 1 週間、冷蔵で 1 カ月程度。サビは少ない。

開花期は 4 月下旬～5 月上旬で、ふじ、つがるとは交雑和合。



海外持出禁止



原木のシナノホッペ

種苗法登録品種第 22366 号

シナノホッペ

長野県原種センターより許諾済

☐ 丸葉台 ☐ M9 ナガノ台丸葉付 ☐ JM 7 台

長野県果樹試験場において、昭和 62 年あかねにふじを交配、育成選抜されて長果 20 と命番、現在種苗法登録品種第 22366 号を獲得したふじより 10 日程熟期が早い、着色の濃い良食味品種。

果実は扁円形で果重 300g 程度、果皮は濃紅色に着色する。果肉は黄白色で硬い。蜜入りは中程度、糖度は 15% 前後、酸度は 0.4% 前後で食味良好。熟期は育成地で 10 月末～11 月上旬でシナノスイートとふじの間となる。貯蔵性は常温で 3～4 週間、冷蔵で 6 週間程度である。

樹姿開帳、樹勢中、側枝は出易い。開花期はふじとほぼ同時期で、ふじ、つがるとは交雑和合、シナノスイート、千秋とは交雑不和合。サビは少なく、つる割はふじより少ない。



海外持出禁止



原木のシナノスイート

種苗法登録（平成 26 年 8 月 23 日失効）

シナノスイート

☐ 丸葉台 ☐ M9 ナガノ台丸葉付 ☐ JM 7 台 ☐ JM 2 台

長野県果樹試験場において、昭和 53 年ふじにつがるを交配、育成選抜されて長果 10 と命番、平成 8 年種苗法登録品種第 5139 号を獲得した。

果実は円形で、果重 320g 前後と大玉。果皮は赤～濃赤色縞状に着色し、平暖地では淡いが、高標高地帯では濃着色する。糖度 14～15% と高く、酸味は 0.3% と少ない。果肉のきめ・硬さは共に中で、果汁多く食味優良である。熟期は育成地で 9 月下旬～10 月上旬。千秋とほぼ同じかやや遅い。貯蔵性は普通貯蔵で 2 週間程度、冷蔵では 2 カ月程度と中生種としては良い。生理落果や果実の生理障害はない。芯カビは生育期間高温の年にみられるが、芯腐れには至らない。

樹姿・樹勢共に中庸で、花芽の着生よく収量性は高いと見られる。主要品種との相互の交配親和性は高い。自家結実性はみられない。通常防除で病害虫被害の目立つものはない。



原木のシナノゴールド

種苗法登録（令和 6 年 8 月 12 日失効）

シナノゴールド


☐ 丸葉台 ☐ M9 ナガノ台丸葉付 ☐ JM 7 台 ☐ JM 2 台

長野県果樹試験場において、昭和 58 年にゴールドに千秋を交配、育成選抜されて長果 15 と命番、平成 11 年種苗法登録品種第 7328 号を獲得した、中生の美味黄色品種である。

果実は長円形で、果重 300g 前後。果皮は黄色で、つるさびの発生は多いが程度は少、果点のさび、荒れは少ない。果肉は黄白色で、きめ、硬さは共に中で果汁多い。糖度 15% 前後、酸度 0.4～0.5%、甘酸適和を代表する優良食味である。熟期は育成地で 10 月中旬、王林より 2 週間程早い。貯蔵性は常温で 2～3 週間、冷蔵で 3 カ月程度と長い。

樹姿・樹勢共に中庸、花芽の着生良い。主要品種との交配親和性高く、自家結実性も認められるが、開花期が遅いので授粉樹には不適當である。玉揃い良く、果実の生理障害・収穫前落果は少ない。

黄色種であり、酸味はやや強いので、適期収穫の励行を願いたい。



リンゴ長果 34

種苗法登録品種第 30452 号

キルトピンク

長野県原種センターより許諾済

海外持出禁止
長野県内のみ栽培可

□丸葉台

長野県果樹試験場が「ピンクパール」と「紅玉」の交雑実生から選抜と「シナノスイート」との交配を経て育成した赤果肉品種。

11月上旬から中旬に成熟し、果実の大きさは300～400g程度、果形は円、果皮色は濃赤色。果実の着色は、果心を除く果肉部分の全面または一部がピンク色に着色する。糖度は15%、酸度は0.8%程度で、糖度と酸度が高く、生食した場合、酸味は強いものの食味は濃厚である。また、硬度は14ポンド程度で、果汁が多くサクサクした食感がある。冷蔵条件で2カ月程度貯蔵できる。

果肉色を活かしたサラダ用のカットフルーツやセミドライ加工等、新たな需要の創出が期待されている。



原木のシナノドルチェ

種苗法登録品種第 12732 号

シナノドルチェ

長野県原種センターより許諾済



海外持出禁止

□丸葉台 □M9 ナガノ台丸葉付 □JM 7台

長野県果樹試験場において、昭和58年シナノゴールドと同じくゴールデンに千秋を交配、選抜育成されて長果17と命番、平成17年種苗法登録品種第12732号を獲得したつがるに続いて収穫できる早生品種。

果実は長円形で、果重300g前後。果皮は縞状に中程度に着色する。果肉の硬さは中、肉質はやや粗く蜜は入らない。糖度14%前後、酸度0.4～0.5%で共に中、香気多く果汁多く食味は優良である。熟期は育成地で9月上～中旬、つがるより10日程遅い。芯カビ、収穫前落果は年により発生が認められるので要注意。貯蔵性は常温で2週間程度。

樹姿やや開張で、樹勢・大きさは中。開花期はふじよりやや遅く、主要品種の多くと交雑和合性であるが、王林とは交雑不和合。



JM系台木

農研機構果樹研究所リンゴ研究拠点において、昭和47年丸葉海棠「セイシ」にM9を交配、昭和59年10系統を選抜、翌年系適供試された。挿木繁殖可能なわい性台木として、平成8～9年5系統農林登録され、平成11～12年種苗法登録品種となったりんごわい性台木である。

JM系台木は、日本の気候風土に根ざす東洋系わい性台木として、最大の注目をあびて発表され、リンゴ研究拠点において長年の実績があり営利栽培用台木として広く活用可能です。

栽培面積の最も多い「ふじ」は、JM1が最適と思われ、JM1は地上に出す長さに反応する台木として注目されます。ふじ以外の品種はJM1又はJM7が有望と思われます。JM2は半わい性で、無支柱わい性栽培用の台木として期待されます。

リンゴ研究拠点成績による特性表

品種	わい化度	生産効率	耐水性	ACLSV	ASPV	A・ワタムシ	支柱	挿木
JM1	わい性	高	中	感受性	抵抗性	抵抗性	要	良
JM7	わい性	高	強	抵抗性	抵抗性	抵抗性	要	良
JM2	半わい性	中	強	抵抗性	抵抗性	感受性	—	極良

生産性を著しく低下させる要注意潜在ウイルス

◎ ACLSV リンゴクロロティックリーフスポットウイルス
○ ASGV リンゴステムブルーピングウイルス
◎ ASPV リンゴステムピッチングウイルス
○ PSBV リンゴプラチカルパスケーリーバークウイルス
弊社生産発売のりんご苗木は全て ACLSV 普通系フリーです。

りんご授粉専用品種

(独) 農研機構果樹研究所がふじ・つがるの単植化に向けた授粉樹として選定した品種。

農研機構
センチネル

センチネル

□丸葉台

ふじより開花が数日早く、頂芽花を主体に腋芽花も利用でき、ふじの授粉樹として優れている。蕾はピンクであるが、開花に伴って花弁は白くなる。樹勢はやや強く、樹は直立性で側枝は出にくい。

農研機構
レッドバッド

レッドバッド

□丸葉台

開花始めはふじより2日遅いが、満開期はほぼ同時である。樹冠の拡大は比較的早く、側枝の発生や花芽の着生は良好。赤い小さい果実がたわわに実るが、樹上での持ちが良いので花材としても注目される。



RED SPORT FUJI

ふじ枝変わり品種

小町園
KOMACHI
EN CO.,LTD.



原木のふじいち

ふじいち®

(有) 小町園商標登録品種

☐ 丸葉台 ☐ M9 ナガノ台丸葉付 ☐ JM 1 台 ☐ JM 2 台

松本市梓川の原俊朗氏の園で最近発見された三島系ふじの枝変わりで、究極の二系タイプ着色系と言って過言でない、全面濃紅色縞状着色系統である。着色明るく食味良好で玉揃い良く豊産。その他熟期、枝梢等の形質はふじと同じである。



原木の長ふ 12

長ふ 12

☐ 丸葉台 ☐ M9 ナガノ台丸葉付 ☐ JM 1 台

松本市梓川の故原今朝生氏の園にて発見されたふじの二系タイプ着色系枝変わりで、長野県下全域導入対象系統である。

濃紅色縞状に全面着色するが、着色が進むと縞は不明瞭になる。無袋で着色明るく、平暖地にて着色は安定している。熟期はふじより数日早く(長ふ 2 と長ふ 6 の中間)、食味良好で玉揃いも良い。



レッドセブン

レッドセブン

☐ JM 1 台

岐阜県中津川市の豊楽園で発見された長ふ 2 の一樹変異。

長ふ 2 より 1 週間、ふじより約 2 週間早熟で、着色形態・玉揃い・蜜のり等は、本来の長ふ 2 と同様で、早生ふじにありがちな果肉の軟化はなく、食味は本来の長ふ 2 と同様に優良である。



三島系ふじ

三島系ふじ

☐ 丸葉台 ☐ M9 ナガノ台丸葉付

秋田県平鹿郡三島地区にて発見された系統で、秋ふ 47。縞が明瞭な二系で、果実に葉が密着した部分以外は着色する特性があり、着色管理省力化可能系統として注目されている。着色の濃さは長ふ 2・12 より劣る。熟期はふじよりやや早い、長ふ 2・12 より遅れる。



SWEET APPLE

りんご有望品種


 小町園
KOMACHI
EN CO., LTD.


スマイルつがる

スマイルつがる

選抜命名元

□丸葉台 □M9 ナガノ台丸葉付

長野県松本市梓川の佐原園において、松田系として導入した中より、着色・食味共に優れる系統を更に選抜した、優良着色系つがるであり、標高660m地帯では8月一杯に出荷が終了出来る。

果実は350g以上と大きく、糖度14～15.5%と高く、果汁多く食味優れる。着色と熟度の進行が揃い、着色明るく、全面ベタ赤タイプで縞は入らない。熟期は長野県で、8月下旬～9月初旬。

芳明に比べ、着色明るく、果実やや大きく、尻こけ少ない。着色同時進行型なので熟度の遅れはなく、食味優良である。

苗木養成品種 (品種解説省略)

シナノピッコロ (□丸葉台)

西谷紅玉 (□丸葉台 □M9 ナガノ台丸葉付)

王林 (□丸葉台 □M9 ナガノ台丸葉付)

千ちゃん (□JM 7台)

M9 ナガノ丸葉付台木



秋映

種苗法登録 (平成14年3月12日失効)

秋映

□丸葉台 □M9 ナガノ台丸葉付 □JM 7台 □JM 2台

長野県中野市の故小田切健男氏が千秋につがるを交配、育成した中生の品種で、平成5年種苗法登録品種第3411号を獲得したが失効。

果実は長円形で果重300g前後、大きなものは350gになる。果皮は濃紅色に無袋で全面着色する。果肉は硬く肉質やや粗、糖度15%前後、酸度0.45%前後と甘酸適和で食味良好である。熟期は育成地(標高370m)で9月下旬で、日持性良く普通貯蔵で20日～30日間。

裂果はないが、収穫前落果は年により発生するので要注意。こうたろう・シナノゴールドとは交配不適合性である。



千ちゃん

種苗法登録品種の種苗に関する留意点

TOPICS

種苗法に基づく注意

- 海外持出禁止 (公示<農水省HP>参照)
- 自家増殖には許諾が必要、増殖した種苗の譲渡は禁止



長野県登録品種の利用制限はこちら

第三者への種苗の転売・譲渡に関する留意点

- 購入された方が購入された種苗を第三者に譲渡することは育成者権の侵害や登録品種の海外流出等の原因にもなり得ると考えます。
- そのため、購入された種苗の第三者への転売等(例としては、知人への贈与、フリマサイトを通じた売却など)はお控えくださいますようお願いいたします。



長野県農業試験場 HP



JAPANESE PLUM

日本すもも苗木 共台

小町園
KOMACHI
EN CO., LTD.

相川大石

山梨県南アルプス市の相川良平氏の園で発見、栽培されている大石早生の準短果枝群型枝変わりで、大石早生に比べ節間長短かく、樹はコンパクトに整う。その為花芽の着生良く、果実肥大良好でL～LL中心、熟期の揃いも良い。果肉硬度、糖度も高まる傾向がある。熟期その他の形質は大石早生と同じである。

弊社では相川氏より分穂を得て発売致します。

大玉大石早生

大石俊雄氏の育成する大石早生の枝変わりで、山梨県で発見された。熟期は長野県で7月上旬、大石早生より3日程遅れる。果実は短楕円形、果重100g位で玉伸良く、玉揃いも良好。果皮淡赤色、果肉淡黄色でち密。甘酸適和で食味良好。早生の主力経済品種。

サンタローザ

米国で育成された品種で、熟期は長野県で7月中～下旬。果実は楕円形、果重100g前後。果皮鮮紅～濃紅色となるが、初期斑点着色する。果肉黄色、肉質ち密で酸味やや強いが甘味・芳香があり、多汁で品質優良。樹勢極めて旺盛、直立性の豊産種。中生の主力経済品種。

大玉ソルダム

米国より導入されたソルダムの枝変わりで、山梨県で発見された。ソルダムよりやや大玉となり、果重130g前後、果形円形。果皮は紫紅色で果粉がのる。果肉濃紅色で肉質ち密、多汁、甘酸適和で品質極めて優良。熟期は長野県で8月上旬。日持ち良い。樹は開張性で強く、短果枝の着生容易で豊産性。中生の最主力経済品種。

太陽


山梨県甲州市塩山の故反田七郎氏が送り出した晩生の経済品種。果実は長楕円形、150g位の大果で玉揃い良好。果面は濃紅色で美しい。果肉は白色溶軟多漿。糖度13～14%、適酸あり、日持ち良好。熟期はソルダムより20日位おそく、長野県で9月上旬。樹勢旺盛。開花は早く自家授精劣るので授粉樹を要す。



相川大石



サンタローザ



大玉ソルダム



太陽

種苗法登録品種第27055号

シナノパール

長野県原種センターより許諾済

長野県果樹試験場において、平成6年ソルダムに交配親不明にて育成選抜され、平成30年種苗登録品種第27055号を獲得した極晩生・大果李である。

熟期は9月下旬、秋姫より6日程遅い。果実は円形で、果重200g程度、果皮は赤色。果肉は黄色、硬さは中、果汁は多い。糖度19～20%、酸度pH4程度。糖度高く食味良好。

発芽期・開花期はソルダムと同時期。自家不和合で授粉樹を要す。授粉用品種にはハリウッドや太陽が好適。

PVP

海外持出禁止
長野県内のみ栽培可

種苗法登録品種第30868号

ハニービート

果樹協より許諾済

果樹茶業研究部門の選抜系統であるPP-26-6(「ソルダム」×「オザークプレミアム」)と「太陽」を交雑育成。酸味少なく糖度高い、中生の主要品種である「ソルダム」より10日程早く収穫できる品種です。

樹姿は直立性と開張性の間で、樹勢はやや強い。短果枝及び花芽の着生は中程度で、「ソルダム」よりやや劣ります。自家不和合性で、S遺伝子型はScSf。「貴陽」及び「小松すもも」を除く我が国の主要品種が授粉樹として使えます。主要品種に比べて黒斑病の発生は少ない傾向にあります。

短果枝及び花芽の着生は中程度。果形は円形で、果皮色は紅紫、果肉色は黄。果実重は120g程度で「ソルダム」と同程度です。糖度は15%程度と「ソルダム」より高く、酸味はpH4.4程度と「ソルダム」より少なく食味良好。

PVP

海外持出禁止
公示(農水省HP)参照

シナノパール



農研機構©ハニービート

種苗法登録(平成21年2月28日失効)

貴陽

山梨県南アルプス市の高石鷹雄氏が、太陽の自然交雑実生より選抜育成し、平成8年種苗法登録品種第8494号を獲得した巨大李である。

果実は極めて大きく200g前後、円形で果皮は紅色に全面着色して果粉が多い。果肉は淡黄色で、果汁多く糖度高く酸味少なく食味良好。核は大きく中で離核。熟期は育成地で7月下旬、太陽の前頃。

樹は大きく樹勢強い。自家結実性はないので授粉樹を要す。

苗木養成品種(品種解説省略)

ハリウッド ケルシー ハニーローザ
ハニーハート



EUROPEAN PLUM

ヨーロッパスモモ


 小町園
KOMACHI
EN CO., LTD.


サマーキュート

種苗法登録品種第 23005 号

PVP

サマーキュート

海外持出禁止

長野県原種センターより許諾済

☐ 筑波 5 号実生台

長野県果樹試験場において、平成 6 年ベイラーにシュガーを交配、育成選抜され長果 6 と命番、平成 26 年種苗法登録品種第 23005 号を獲得した 8 月下旬に熟する裂果の少ないブルーンである。

果実は楕円形で果重 50 ～ 60g。果皮は紅紫色でやや淡い。果肉は橙色で肉質中位。果汁は中、糖度 20% 前後、酸度は pH3.6 程度。熟期は育成地で 8 月下旬。裂果の発生は少ない。貯蔵性はやや良。

樹勢は弱く、短果枝の長さは中程度。自家和合性で結実良好。

ブルーブル

☐ 筑波 5 号実生台

米国でスタンレイにプレジデントを交配育成したブルーン。

果実は楕円形で、果重 80g 位と大きい。果皮は黒紫色、果肉黄色でち密。糖度 18% 前後で酸味はほとんどなく食味優良。離核。熟期は弊社で 9 月上旬。スタンレイよりやや早い。

樹勢強健で作り易く、豊産。乾燥に要注意。

裂果は多いが大果で今後期待される品種である。



スイートサンブルー

スイートサンブルー

☐ 共台

本種は佐久地方に栽培されるサンブルーンの内でも、より甘味の強い系統を選抜した品種で、完熟させると糖度 20 ～ 22% 位にもなる。普通種に比べ（弊社比）、果実はやや大きく 40g 前後、結実性はより良好で、果実の外観・熟期（9 月上～中旬）・樹勢・樹姿・耐病性は同じ。



オータムキュート

種苗法登録品種第 23238 号

PVP

オータムキュート

海外持出禁止

長野県原種センターより許諾済

☐ 筑波 5 号実生台

長野県果樹試験場において、平成 6 年ベイラーにプレジデントを交配、育成選抜され長果 7 と命番、平成 26 年種苗法登録品種第 23238 号を獲得した 9 月下旬に熟する裂果の少ないブルーンである。

果実は楕円形で果重 80g 前後。果皮は青紫色で外観優れる。果肉は橙色で果汁多い。糖度は 22% 前後、酸度は pH3.8 程度。熟期は育成地で 9 月下旬。裂果の発生は少ない。貯蔵性は他主要品種に比べ良い。

樹勢は弱く、短果枝の長さは短い。自家不和合性で授粉樹を要す。

ベイラー

☐ 筑波 5 号実生台

カナダ、オンタリオのビネランド試験場で、インペリアルエビネウスにグランドデュークを交配育成したブループラムで、弊社が昭和 55 年直輸入して、試作してきた品種である。

果実は楕円形、果重 60g 前後でスタンレイと同程度。果皮黒紫色で美しい。果肉黄緑色で肉質極上。糖度非常に高く 22 ～ 24%、果汁多く食味極上で特に生食用に適する。熟期は弊社で 9 月上～中旬でスタンレイと同時期やや遅い。

樹は強勢、開張で作り易い。裂果少なく豊産である。

プレジデント

☐ 筑波 5 号実生台

ブループラムに属する李で、果実 80g 前後と大果である。果形楕円、果皮青紫色で美しく、果肉は黄色でやや硬い。離核で核はやや大きい。熟期は長野県で 9 月中旬。未熟果は特に味薄いので完熟果の出荷が望まれる。樹勢よく直立性で豊産。大果で今後期待される品種。

苗木養成品種（品種解説省略）

トレジディ ☐ 共台ツアー ☐ 筑波 5 号実生台スタンレイ ☐ 筑波 5 号実生台

種苗法登録品種の証紙付販売について

(一社)日本果樹種苗協会の取り扱う種苗法登録(出願公表)品種には、苗木1本に1枚果種協発行の証紙がつきます。

証紙は、販売される苗木が種苗法登録品種許諾済正規流通品であることを証明しますので、定植後も大切に保存して下さい。




なお、証紙のつかない苗木は非正規品です。非正規種苗の流通に関与した者、非正規種苗を用いて生産した果実を販売した者は、種苗法により10年以下の懲役と1,000万円以下の罰金刑が課せられますのでご注意ください。



長野県育成品種の苗木生産は、許諾を得た長野県内の種苗業者のみにて限定されています。

長野県育成の登録品種と登録出願中品種には、(一社)長野県原種センター発行の「証紙」が苗木1本に1枚ずつ付きます。

これらの「証紙」はその苗木が長野県育成品種の正規流通品であることを証明するものですので、定植後も大切に保存して下さい。



農 林 水 産 省 登 録 業 者 (一社)日本果樹種苗協会会員 長野県果樹種苗協会会員
日本果樹種苗業者協議会会員 (一財)長野県果樹研究会賛助会員



このマークは種苗法の登録品種を表示するマークです。

わが国の種苗法に基づく「登録品種」の種苗や、これらの種苗から得られた収穫物、政令で定める加工品に表示しています。植物新品種は知的財産権(育成者権)として保護されており、このマークの付いている種苗を、育成者の許諾なしに業として利用(増殖、譲渡、輸出入など)する行為は、損害賠償、刑事罰の対象となる場合があります。

このマークは、品種保護制度および育成者権の正しい理解と普及、育成者権の侵害を未然に防止することを目的として、わが国の種苗関係4団体((一社)日本種苗協会、(一社)日本果樹種苗協会、(一社)日本草地畜産種子協会、(公社)農林水産・食品産業技術振興協会)が商標権を取得し、関係者に利用を促進してきた商標です。

種苗法の改正に伴って、4団体が所有していた商標権は農林水産省に移転しています。

※ PVP: Plant Variety Protection (植物品種保護) の略

当社の苗木は裸苗の状態でのお届けとなりますので、出荷時は充分湿気を与えビニール等で被覆することで乾燥防止に努めます。苗木到着後はすぐに開封し内容をご確認ください。また、苗木1本ごとに名札をつけておりません。結束ひもの色や束で分かるようにしてありますので、結束ひものを解く際は充分ご注意ください。

団体等一括購入の場合の配布については、長時間に及ぶことが多いので、乾燥防止に努め風の当たらない日陰の涼やかな場所で行なうようお願い致します。万一乾燥の生じた場合には、その度合により一昼夜前後水につけ、充分に水分を与えてから植え付けを行なってください。

当社における個人情報の取り扱いについて

お客様の「住所・氏名・電話・FAX番号」等の個人情報につきましては法に基づき厳重に管理し、カタログの送付、商品の受注、発送、それらに関わるご連絡を電話、封書、メール等で行なうなど、当社のサービス提供の目的にのみ使用いたします。

苗木の仮植について

(1)仮植

仮植を行うには図1の方法を用いる。土地は保水力に富む日当たりの良い場所を選ぶ。(越冬も同じ)

束をとき一本一本ばらばらにして仮植穴に並べ、細根の部分にまでまんべんなく土を入れ乾燥の被害を受けないようにする。尚束をとく時には、風雨に落とされないラベルを付けて、品種を明確にしておくことが大切である。

(2)越冬

越冬には図2の方法を用い、根部を土の厳寒時凍結部以下になるようにして伏せ、苗木下部50cm位を土に入れ、細根部分には仮植時以上にていねいに土を入れる。梅、柿等寒さに弱い苗木は70cm以上を土の中に入れる。越冬中は野鼠、野兔の被害防止に留意する。

図1




図2



ご注文についてのお願い

- ◎ご注文は文書にて、住所・氏名・郵便番号・電話・FAX 番号・品種名・台木名・数量等を明記してください。
在庫確認は電話にても返答致しますがトラブルが多いため、必ず文書にて正式注文願います。
- ◎弊社は1口10本未満の発送や初歩的な技術指導は労力的にできませんのでご了承ください。なお、店頭販売は1本から販売できますが、完全予約制でございます。
- ◎苗木代金は必ず前金でいただきます。官公庁、各種団体、農協等後払の場合は、公文書をお送りください。
なお、前記団体及び個人大量注文の場合は別途見積いたしますので、申し付けください。
- ◎ご送金は現金書留、郵便振替（00530-4-19856番…弊社到着に要1週間）または下記をご利用ください。
 - アルプス中央信用金庫 中川支店（普）2705307番
- ◎荷造運賃はご注文主の負担に願います。
 - 荷造費1,430円、運賃立替元払
 - 運賃につきましては発送場所、本数によって見積致します。

この度運送会社より大幅な改定が通達されました。
お客様のご負担も増えると存じますがご理解いただきますようお願い致します。

- ダンボール詰めで発送致します。また、ご注文の内容により運送会社が異なります。

- ◎運送規格の改定により、箱にあわせて苗木の頭部を切らせて頂く場合がございます。予めご了承ください。
- ◎出荷及び店頭小売期間
 - 11月25日～12月15日、3月10日～3月末日。
 - 小売時間 AM 10:00～11:30 PM 12:30～3:30
 - 休業日 日曜
 - 大口注文より優先発送致します。
 - 個人のお客様宛の発送につきましては、日付指定・時間指定をお伺いすることができません。また、遠方への発送は運送会社の都合、日曜祝日を除き最大中3日かかります。
- ◎弊社苗木の生産・出荷には万全を期しておりますが、万一の事故等の際には、お買上同一苗木又は代金の返済を持って最大限の補償と致します。あらかじめご了承の上、ご注文くださいますようお願い致します。

本カタログ掲載解説及び写真の無断転載を禁じます。

TEL (0265)88-2628

FAX (0265)88-3728



For the professional grower



Fruit Tree Nurseries

 **KOMACHIEN CO., LTD.**

6626-2, Katagiri, Nakagawa Mura, Kami Ina Gun, Nagano Pref., 399-3802, Japan

TEL. (0265) 88-2628

FAX. (0265) 88-3728

<http://www.komachien.net/>

FRUIT TREE CATALOG
Autumn 2026 – Spring 2028